



BIO PEST

I. COMPOSICION PORCENTUAL

COMPONENTES	PORCENTAJE
INGREDIENTE ACTIVO	
ACEITES ESENCIALES: CINNAMOMUN ZEYLANICUM, AZADIRACHTA INDICA Y SYZYGIIUM AROMATICUM	31.00 %
EXTRACTOS BOTÁNICOS: LARREA TRIDENTATA, ARGEMONE MEXICANA, CINNAMOMUN ZOYLANICUM Y RICINUS COMMUNIS L.	53.70 %
DILUYENTES Y DISPERSANTES	15.30 %
TOTAL	100 %

II. CARACTERISTICAS

Bio Pest es un insecticida, acaricida y repelente de amplio espectro, elaborado con altas concentraciones de aceites esenciales y extractos de origen botánico, por su balanceada y óptima formulación logra alterar el sistema nervioso del insecto, y mueren por inanición.

Bio Pest también interrumpe la actividad reproductiva, los procesos de muda, adicionado a su acción repelente y por contacto.

III. MODO DE ACCIÓN

Bio Pest actúa por contacto (repelencia).

IV. MECANISMO DE ACCIÓN

Bio Pest inhibe la alimentación y altera el crecimiento de los insectos y ácaros. Los aceites esenciales y extractos botánicos que contiene afectan la integridad de la cutícula, interfieren en procesos hormonales relacionados con la muda, reduce la alimentación y reproducción, lo que genera efectos neurotóxicos naturales que disminuye la población de las plagas.

V. FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Bio Pest se usa normalmente según la incidencia de las plagas.

Preventivo: Cada 7 a 10 días.

Incidencia baja de la plaga: Cada 5 a 7 días.

Incidencia alta: Cada 3 a 5 días.

VI. COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Bio Pest no es fitotóxico a los cultivos y dosis aquí recomendadas, sin embargo en el caso de mezclarse se recomienda pruebas de compatibilidad previo a la mezcla final.

VII. MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre siga la dosis y frecuencia de aplicación indicados. No utilice el producto en dosis mayores o con alta frecuencia de lo recomendado.

VIII. CONTRAINDICACIONES

No aplicar **Bio Pest** en horas de calor intenso ni cuando existan vientos fuertes (mayores de 15 km/h). Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cuando se requiera mezclar con otros agroquímicos cuyo objetivo de uso sea diferente, como fungicidas que controlen otro tipo de hongos o insecticidas.

IX. INSTRUCCIONES DE USO

Calibración del equipo: Siempre calibre su equipo antes de usar el producto.

Agitar bien antes de usar.



Contacto: biomacgreenlab@gmail.com

www.biomacgreenlab.com

56 6579 3326



X. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	RECOMENDACIONES	DOSIS (L/HA)
ARÁNDANO FRAMBUEZA ZARZAMORA FRESA	MOSCA BLANCA (BEMISIA TABACI) ARAÑA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE) TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS)	ASPERSIÓN FOLIAR PREVENTIVO Y EN BAJA INCIDENCIA	1.0 - 2.0
NOGAL AGUACATE MANGO PAPAYA	MOSCA BLANCA (BEMISIA TABACI) TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS)	ASPERSIÓN FOLIAR PREVENTIVO Y EN BAJA INCIDENCIA	1.5 - 2.5
CHILE JITOMATE PEPINO SANDIA MELON CALABAZA EJOTES	MOSCA BLANCA (BEMISIA TABACI) ARAÑA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE) TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS) GUSANO COGOLLERO (SPODOPTERA FRUGIPERDA)	ASPERSIÓN FOLIAR PREVENTIVO Y EN BAJA INCIDENCIA REALIZAR PREVIA EVALUACIÓN.	1.5 - 2.5

XI. GARANTIA

Biomac Green Lab garantiza que el ingrediente activo corresponde a lo señalado, siempre y cuando se encuentre en su empaque original y este almacenado en lugares bien ventilados. La empresa no se hace responsable por los resultados de uso, almacenamiento, transporte y manejo que este en malas condiciones.



Contacto: biomacgreenlab@gmail.com

www.biomacgreenlab.com

56 6579 3326