



I. COMPOSICION PORCENTUAL

COMPONENTES	PORCENTAJE
INGREDIENTE ACTIVO	
AMINOACIDOS	3.00 %
OXIDO DE CALCIO	10.40 %
BORO	0.50%
AGENTES COMPLEJANTES Y DILUYENTES: ACIDOS HUMICOS Y AGUA	86.1 %
TOTAL	100 %

II. CARACTERISTICAS

Cabo flor es una solución de calcio con boro en forma líquida quelatada y complejada con Ácidos húmicos indicada para la aplicación foliar en el control preventivo y curativo de carencias de boro, necrosis apicales etc.

Cabo flor Se utiliza principalmente en las etapas de floración y crecimiento del fruto, ya que el calcio y boro son componentes estructurales de la pared celular y están implicados en la permeabilidad de la membrana plasmática, por lo que intervienen en el transporte de nutrientes asimilados los que contribuyen al llenado de los frutos, la adición de los aminoácidos en la formulación de **Cabo flor** permite a la planta formar proteínas más rápido y con menor gasto de energía. El ahorro de energía favorece el balance entre la fotosíntesis y la respiración.

III. BENEFICIOS

- Rápida asimilación
- Buen amarre de flores
- Aporte extra en el cuajado y fructificación
- Mayor rendimiento en la cosecha
- Mejora la calidad y vida poscosecha

IV. MODO DE APLICACIÓN

Para la preparación de la solución de aspersión. No aplique cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando haya altas temperaturas.

1. Agite el envase vigorosamente, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad.
2. Medir la cantidad a aplicar en un recipiente graduado y vierta en una cubeta con agua para pre-mezclar
3. Vierte la pre-mezcla en el tanque de aplicación, agite y complete el volumen total de agua a usar.

V. COMPATIBILIDAD

Cabo flor no se debe mezclar con productos que contengan aceites minerales, fopsfatos o sulfatos en su formulación.

VI. FITOTOXICIDAD

Cabo flor no es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis recomendadas. Sin embargo en el caso de hacer mezclas, se recomienda pruebas de compatibilidad previo a la mezcla final

VII. INSTRUCCIONES DE USO

Calibración del equipo: Siempre calibre su equipo antes de usar el producto.
Agitar bien antes de usar.



Contacto: biomacgreenlab@gmail.com

www.biomacgreenlab.com

56 6579 3326



VIII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	EPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
AGUACATE	DURANTE LA BROTAÇÃO EN PRIMAVERA	1.5 - 2.5 L/HA
AJO, CEBOLLA	CUANDO HAYA SUFICIENTE SUPERFICIE FOLIAR . SDE PUEDE REPETIR 10-14 DIAS DESPUÉS	1.2 L/HA
BROCOLI, COL, COLIFLOR	ENTRE 4 A 6 HOJAS Y SE PUEDE REPETIR EN INTERVALOS DE 10 - 14 DIAS DESPUÉS	3 L/HA
ARROZ	AL COMIENZO DEL MACOLLAJE	1 L/HA
CAFE	DURANTE EL PERIODO QUE HAY ENTRE EL INICIO DEL CRECIMIENTO, HASTA ANTES DE LA FLOREACIÓN. REPETIR EN POSTCOSECHA	3 L/HA
CEREALES	ENTRE 4 Y 6 HOJAS	1 L/HA
CEREZA	EN YEMA BLANCA SE PUEDE APLICAR. ADEMAS EN LA COSECHA Y ANTES DE LA CAÍDA DE HOJAS	1 - 2 L/HA
CIRUELO	EN YEMA DE INVIERNO Y YEMA ROSADA, SE PUEDE REPETIR DESPUES DE LA COSECHA Y ANTES DE LA CAÍDA DE LAS HOJAS	2 - 3 L/HA
CITRICOS	EN BROTES BLANCOS	2 - 3 L/HA
CHILE	PRE-FLORACIÓN Y POST-FLORACIÓN	1 L/HA
DURAZNO	EN YEMA DE INVIERNO Y YEMA ROSADA SE PUEDE REPETIR DESPUES DE LA COSECHA Y ANTES DE LA CAÍDA DE FLORES.	1 - 2 L/HA
FRESA	DESDE EL BOTON VERDE Y DE 10 A 14 DIAS MÁS TARDE	1 - 2 L/HA
LECHUGA	10 A 14 DIAS DESPUES DE TRASPLANTE	1 - 2 L/HA

IX. GARANTIA

Biomac Green Lab garantiza que el ingrediente activo corresponde a lo señalado, siempre y cuando se encuentre en su empaque original y este almacenado en lugares bien ventilados. La empresa no se hace responsable por los resultados de uso, almacenamiento, transporte y manejo que este en malas condiciones.



Contacto: biomacgreenlab@gmail.com

www.biomacgreenlab.com

56 6579 3326