



I. COMPOSICION PORCENTUAL

COMPONENTES	PORCENTAJE
INGREDIENTE ACTIVO	
FOSFITO ÁCIDO DE POTASIO (EQUIVALENTE A 809 G DE I.A./L A 20°C)	55.4 %
DILUYENTES Y ACONDICIONADORES	44.6 %
TOTAL	100 %

II. CARACTERISTICAS

Fitolex K es un producto de alta concentración en fosfito de potasio, formulado para ser rápidamente absorbido y traslocado por la planta a través del xilema y floema.

Fitolex K estimula la floración, reduce abortos florales y promueve un mejor amarre y llenado de frutos. Compatible y potenciador de tratamientos fungicidas. Aplicable en todas las etapas del cultivo: Desarrollo vegetativo, floración y fructificación.

III. MECANISMO DE ACCIÓN

Fitolex K actúa como inductor de defensas naturales, estimulando mecanismos que fortalecen la estructura celular y aumentan la reproducción de compuestos antimicrobianos como fitoalexinas, lignina e hidropoxina. Mejora la salinidad y resistencia de la planta frente a estrés biótico y abiótico.

IV. FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Fitolex K puede ser aplicado según las condiciones que atraviese el cultivo, de manera general:

- Aplicación foliar preventiva: Cada 10 a 15 días
- En periodos de alta presión de enfermedades: Cada 7 a 10 días

V. COMPATIBILIDAD

Fitolex K no deberá mezclarse con otros productos.

VI. MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre siga la dosis y frecuencia de aplicación indicados. No utilice el producto en dosis mayores o con alta frecuencia de lo recomendado.

VII. CONTRAINDICACIONES

No aplicar **Fitolex K** en horas de calor intenso ni cuando existan vientos fuertes (mayores de 15 km/h). Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cuando se requiera mezclar con otros agroquímicos cuyo objetivo de uso sea diferente, como fungicidas que controlen otro tipo de hongos o insecticidas.

VIII. INSTRUCCIONES DE USO

Calibración del equipo: Siempre calibre su equipo antes de usar el producto.

Agitar bien antes de usar.



Contacto: biomacgreenlab@gmail.com

www.biomacgreenlab.com

56 6579 3326



IX. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	RECOMENDACIONES	DOSIS (L/HA)
LECHUGA	MILDIU (BREMIA LACTUCAE)	REALIZAR 4 APLICACIONES AL FOLLAJE, EN UN INTERVALO DE 7 DIAS. INICIAR LAS APLICACIONES CUANDO SE DETECTEN LAS PRIMERAS SÍNTOMAS. VOLUMEN DE CAPACIDAD: 400 L/HA	1.5 - 2.0
CALABAZA MELON SANDIA PEPINO CHAYOTE	MILDIÚ (PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS) MOHO GRIS (BOTRYTIS CINEREA)	REALIZAR 3 APLICACIONES AL FOLLAJE, A INTERVALOS DE 7 DIAS. VOLUMEN DE APLICACIÓN 550 A 650 L DE AGUA/HA	3.25 - 3.75
BERENJENA CHILE JITOMATE PAPA TOMATE DE CASCARA	TIZÓN TARDÍO (PHYTOPHTORA INFESTANS) TIZÓN TEMPRANO (ALTERNARIA SOLANI)	REALIZAR 4 APLICACIONES AL FOLLAJE, A INTERVALOS DE 15 DIAS. VOLUMEN DE APLICACION 550 A 650 L AGUA/HA	3.25 - 4.75

X. GARANTIA

Biomac Green Lab garantiza que el ingrediente activo corresponde a lo señalado, siempre y cuando se encuentre en su empaque original y este almacenado en lugares bien ventilados. La empresa no se hace responsable por los resultados de uso, almacenamiento, transporte y manejo que este en malas condiciones.



Contacto: biomacgreenlab@gmail.com

www.biomacgreenlab.com

56 6579 3326